

März 2014

Anleitung zur Auflösung von Q-Potenzen

Man nimmt eine verschliessbare Flasche von 250ml (2.5dl). Hierzu wird am besten die von meiner Praxis abgegebene Medikamentenflasche verwendet.

Allerdings muss die Flasche, wenn sie eine andere Medikation enthalten hat, vorher ausgekocht werden, damit alle Spuren des vorangehenden Medikamentes getilgt werden.

Dann wird die Flasche zu zwei Dritteln (ca. 200ml) mit normalem Trinkwasser oder auch destilliertem Wasser gefüllt. Es kann auch Mineralwasser verwendet werden.

In diese Flüssigkeit wird **die gesamte von Dr. Seiler verordnete Anzahl Globuli** aufgelöst.

Zur Konservierung werden dann 2 Esslöffel eines hochprozentigen Alkohols eingefüllt (möglichst über 30 Volumenprozent, z.B. Schnaps, Whisky, Wodka).

Aufbewahrung der Lösung:

Die Lösung bleibt mindestens 2-3 Wochen gut haltbar, am besten gekühlt. Vor Lichteinfall und starker Wärmeeinwirkung schützen.

Einnahme nach Anweisung.

→ Vor jeder Einnahme die Lösung durch etwa fünf Schüttelschläge gegen einen elastischen Gegenstand (die Gegenhand, ein Buchdeckel aus Leder etc.) potenzieren!

Die beste Einnahmezeit morgens ist nüchtern, abends direkt vor dem Einschlafen.